


NHÂN THỨC LAN TỎA NGỪNG KHÁNG THUỐC

Cứ 10 bệnh nhân thì có 1 người bị nhiễm trùng.
Nhân viên y tế có thể giảm sự lây lan của bệnh nhiễm trùng
bằng cách đảm bảo tay, dụng cụ và môi trường sạch sẽ.



World Health
Organization



Antibiotics
Antivirals
Antifungals
Antiparasitics

NHÂN THỨC LAN TỎA NGỪNG KHÁNG THUỐC

Kháng thuốc ngày càng gia tăng ở các bệnh nhiễm ký sinh trùng như sốt rét và nhiễm giun sán. Vì vậy, luôn tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để được chẩn đoán chính xác và chỉ định phác đồ điều trị hợp lý.



World Health
Organization



Antibiotics
Antivirals
Antifungals
Antiparasitics

NHẬN THỨC LAN TỎA NGỪNG KHÁNG THUỐC

Sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách:

- Chỉ dùng thuốc khi được kê đơn.
- Tuân thủ hướng dẫn về liều lượng và thời gian điều trị.
- Không chia sẻ hoặc dùng thuốc kháng sinh còn sót lại từ người khác.



World Health
Organization



Antibiotics
Antivirals
Antifungals
Antiparasitics

NHẬN THỨC LAN TỎA NGỪNG KHÁNG THUỐC

Tiếp cận với nguồn nước an toàn, vệ sinh và rửa tay trong gia đình và cơ sở y tế có thể giảm tới 60% việc sử dụng kháng sinh để điều trị tiêu chảy. Rửa tay giúp ngăn ngừa nhiễm trùng kháng thuốc và giảm chi phí y tế.

Rửa tay giúp ngăn ngừa
nhiễm trùng kháng thuốc
và giảm chi phí y tế.



World Health
Organization



Antibiotics
Antivirals
Antifungals
Antiparasitics